

Universidad de Texas A&M-Kingsville
PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN HUERTAS CITRICOLAS, 2007 / 2008
(Ver dosis de químicos al reverso)

DESPUES DE FLORACION Marzo - Mayo

Programa de Aspersión

Arador de los Cítricos y Acaros — VENDEX o COMITE o NEXTER o DANITOL

Arador de los Cítricos — AGRIMEK (+ ACEITE o CITRI-KING) o MICROMITE (+ ACEITE o CITRI-KING)
o VYDATE

Thrips — CARZOL o SPINTOR o VYDATE

Melanosis —ABOUND o ENABLE o GEM o HEADLINE o formulaciones a base de cobre

Programa Alterno

Arador de los Cítricos y Nemátodo de los Cítricos — TEMIK

Aplicación de Temik requiere el uso de equipo para la deposición exacta de producto e incorporación al suelo
(Aplicar antes del 30 de abril, incorporar los granulos al suelo e irrigar)

MANEJE LOS PLAGUICIDAS CON CUIDADO Y LEA TODA LA ETIQUETA

VERANO Junio - Julio

Escamas Armadas — ACEITE o LORSBAN o SUPRACIDE o ESTEEM

Arador de los Cítricos — AGRIMEK (+ ACEITE o CITRI-KING) o MICROMITE (+ ACEITE o CITRI-KING) o VENDEX

Mancha Grasienta — ABOUND o ENABLE o GEM o HEADLINE o formulaciones a base de cobre

FINAL DEL VERANO - OTOÑO Agosto - Octubre

Todo tipo de ácaros — ENVIDOR (+ ACEITE o CITRI-KING) o VENDEX o NEXTER o DANITOL

Escama Café Suave, agregar — SEVIN o ESTEEM

Escamas Armadas, agregar — LORSBAN o SUPRACIDE o ESTEEM

Mancha Grasienta, agregar — uno de los fungicidas listados previamente

Acaros que persisten durante el invierno — COMITE

(NO APLIQUE COMITE mezclado con aceite o con solventes a base de petróleo)

NO APLIQUE PRODUCTOS A BASE DE ACEITE CUANDO LA HUMEDAD ESTA POR DEBAJO DEL 30%

Mosca Prieta de los Cítricos — cuando el 1er estadio ninfal aparece en las hojas, aplique:

ESTEEM o PROVADO o LORSBAN o DANITOL

Minador de la hoja de Cítricos — cuando el 20% de los nuevos brotes foliares muestren signos de daño, aplique:

AGRIMEK (+ ACEITE o CITRI-KING) o MICROMITE (+ ACEITE o CITRI-KING) o PROVADO o SPINTOR

Psílido de los Cítricos — cuando el 20% de los nuevos brotes foliares muestren ninfas (estadios inmaduros), aplique:

PROVADO o LORSBAN o DANITOL

(o cuando las plagas mencionadas comiencen a aparecer, aplique ADMIRE PRO en tratamiento al tronco o al suelo)

Hormigas — tratar los nidos en el suelo de la huerta con:

LORSBAN (granular o en aspersión) o CLINCH en cebos o ESTEEM en cebos

Prevención de pudrición al pie en arboles con tronco cubierto o aporcado:

remojar el tronco con RIDOMIL (en una solución de 1:3 a 1:15) o aplicar ALIETTE como aspersión foliar o al tronco

ROTAR EL USO DE LOS PLAGUICIDAS PARA EVITAR EL DESARROLLO DE RESISTENCIA

PARA INFORMACION ADICIONAL CONTACTE AL CENTRO DE CITRICOS
312 N. International Blvd, Weslaco, TX 78596
Teléfono: (956) 447-3360, Facsimile: (956) 969-0649
o envíe correo electrónico a los autores: J. Victor French: jv-french@tamu.edu
Mamoudou Sétamou: Msetamou@ag.tamu.edu
Boris A. Castro: bacastro@ag.tamu.edu (si desea información en español)
Mani Skaria: m-skaria@tamu.edu

2007 / 2008

IMPORTANTE: Lea las Precauciones al Reverso de esta Hoja

LEA TODA LA ETIQUETA DE LOS
PLAGUICIDAS CUIDADOSAMENTE

EFICACIA CONTRA ALGUNAS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CITRICOS
(++ = Muy Efectivo; + = Ayuda un Poco; 0 = No Ayuda)

PLAGUICIDAS	DOSIS / ACRE†	INTERVALO		ACAROS	ESCAMAS ARMADAS	ESCAMAS SUAVES	MINADOR					THRIPS	NEMATODO		MANCHA		PHYTOPH-THORA ^
		DE ENTRADA (HORAS)	ARADOR DE LOS CITRICOS				DE LA HOJA	PSILIDO DE LOS CITRICOS	MOSCA PRIETA	PICUDO DE LA RAIZ	HORMIGAS		DE LA RAIZ	GRASIENTA Y MELANOSIS			
ADMIRE PRO *	7 -14 oz	12	0	0	++	++	++	++	++	++	+	0	0	0	0	0	0
AGRIMEK 0.15 EC ¹	10 - 20 oz	12	++	+	0	0	++	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0
ASSAIL 70 WP	1.7 - 5.7 oz	12	0	0	+	0	++	0	0	0	++	0	0	0	0	0	0
CAPTURE 2 EC ^{1*}	16 - 32 oz	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0	0
CARZOL SP	½ - 1¼ lb	48	++	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0	0	0
CITRI - KING	2 - 4 qt	12	0	+	0	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0
CLINCH BAIT	1 lb	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0
COMITE EC	2 - 3 pt	48	+	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DANITOL 2.4 EC ¹	16 - 21 ½ oz	24	+	++	0	0	0	0	++	++	+	+	0	0	0	0	0
ENVIDOR 2 SC ²	13 - 20 oz	12	++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTEEM 0.86 EC	8 - 16 oz	12	0	0	++	+	+	+	+	++	0	0	0	0	0	0	0
ESTEEM BAIT	1.5 - 2 lb	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0
LORSBAN 4 E ¹	4 - 7 pt	24	+	0	++	+	0	++	+	+	+	0	++	0	0	0	0
LORSBAN 15 G	6 - 7 lb	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0
MALATHION 57 EC	1¼ - 2 pt	12	0	0	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0
MICROMITE 80 WGS ¹	6.25 oz	12	++	0	0	0	++	+	0	0	0	++	0	0	0	0	0
MUSTANG MAX ¹	2.8 - 4 oz	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	0	0	0
NEXTER 75 W	5.2 - 10.67 oz	12	++	++	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PETROLEUM OIL	5 - 10 gal	12	+	+	++	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+	0
PROVADO 1.6 F	10 - 20 oz	12	0	0	++	++	++	++	++	++	+	0	0	0	0	0	0
SEVIN 80 S	3¾ - 6¼ lb	12	+	0	+	++	0	+	0	0	0	++	0	0	0	0	0
SPINTOR 2 SC	4 - 10 oz	12	0	0	0	0	++	+	0	0	++	0	0	0	0	0	0
SUPRACIDE 2 E ¹	1½ - 5 pt	48	0	0	++	++	+	++	+	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMIK 15 G ^{1,3}	33 lb	48	++	+	+	+	+	++	+	+	0	0	0	++	0	0	0
VENDEX 50 WP ¹	2 - 3 lb	48	++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VYDATE L ¹	2 - 4 pt	48	++	+	0	0	+	+	0	0	0	0	0	+	0	0	0
ABOUND	12 - 15 oz	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0
ALIETTE WDG	2½ - 5 lb	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++
COPPER ⁴	See Label	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0
ENABLE 2F	8 oz	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0
GEM 500SC	4 - 8 oz	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0
HEADLINE	9 - 15 oz	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0
RIDOMIL GOLD EC *	Leer etiqueta	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++

1 Denota uso restringido 3 No usar en mandarinas † Ajustar dentro del rango de dosis basado en el tamaño del arbol X Pudrición al pie, pudrición de la raíz, pudrición café y gomosis

2 Una aplicación por temporada 4 Consultar las dosis en la etiqueta *Aplicar como tratamiento al tronco o al suelo